

Parnate®

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel

- *Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.*
- *Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*
- *Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.*

Inhoud van deze bijsluiter:

1. *Wat is Parnate® en waarvoor wordt het gebruikt?*
2. *Wat u moet weten voordat u Parnate® inneemt.*
3. *Hoe wordt Parnate® ingenomen?*
4. *Mogelijke bijwerkingen.*
5. *Hoe bewaart u Parnate®?*

Naam van het geneesmiddel:

Parnate®

Het werkzame bestanddeel is:

Tranylcyprominesulfaat.

Parnate® omhulde tabletten bevatten tranylcyprominesulfaat overeenkomend met 10 mg tranylcypromine per tablet.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

Kern: calciumsulfaatdihydraat, croscarmellose natrium, magnesiumstearaat, maiszetmeel en sacharose.

Coating: arabische gom, calciumcarbonaat, carmoisine (E 122), carnaubawas, dimethylsiloxaan, ethylcellulose, gelatine, kaolien, maiszetmeel, natriumdioctylsulfosuccinaat, ponceau 4 R (E 124), sacharose, schellak, soja lecithine (E 322), talk, titaandioxide (E 171) en zwart ijzeroxide (E 172).

Registratiehouder:

Goldshield Pharmaceuticals Ltd.
NLA Tower, 12-16 Addiscombe Road
Croydon, Surrey
CR 00 XT, Verenigd Koninkrijk.

Distributeur:

Daleco Pharma b.v.
Enspijk, Nederland.

In het register ingeschreven onder:

Parnate® tabletten zijn in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven onder PL 12762/0075.

Parnate® tabletten zijn niet geregistreerd in Nederland en worden in Nederland op artsenverklaring gedistribueerd door Daleco Pharma b.v. te Enspijk.

1. Wat is Parnate® en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:

Omhulde tabletten (rood) met opdruk FW 251.

Kunststof flacon met 28 tabletten en 250 tabletten.

Geneesmiddelengroep:

Tranylcypromine behoort tot de groep geneesmiddelen die MAO-remmers (mono-amine-oxidase-remmers) genoemd worden.

Het wordt gebruikt om depressies (ernstige neerslachtigheid) te behandelen.

Gebruiken bij:

- De behandeling van ernstige depressie of angststoornissen, in het bijzonder wanneer de behandeling met andere antidepressiva niet geholpen heeft.
Parnate® wordt niet aangeraden voor lichte depressies.

2. Wat u moet weten voordat u Parnate® inneemt.

Gebruik Parnate® niet:

- In combinatie met een ander antidepressivum met inbegrip van een andere MAO-remmer en ook niet binnen 1 week na beëindiging van de behandeling met een ander antidepressivum, met inbegrip van andere MAO-remmers (voor fluoxetine geldt zelfs een termijn van 6 weken).
- In combinatie met buspiron (middel bij behandeling van angstverschijnselen).
- In combinatie met bepaalde middelen tegen vetzucht (obesitas) de zogenaamde indirect-werkende sympathicomimetica zoals o.a. amfetamine en fenfluramine.
- In combinatie met bepaalde middelen tegen verkoudheid en verstopte neus zoals efedrine, Otrivin® en fenylpropanolamine en bepaalde hoestdempende middelen (o.a. dextromethorfan). Ook hoestdranken kunnen deze stoffen bevatten.
- In combinatie met levodopa (middel bij de ziekte van Parkinson) of dopamine (middel bij de behandeling van shock).
- In combinatie met bepaalde sterke pijnstillende middelen zoals pethidine en verwante sterke pijnstillers.
- Bij gelijktijdig gebruik van tricyclische antidepressiva (bepaalde middelen bij depressie) zoals o.a. amitriptyline, imipramine en clomipramine. Bij gelijktijdig gebruik met Parnate® kunnen de volgende verschijnselen optreden: rusteloosheid, verhoogde bloeddruk, verhoging van de lichaamstemperatuur, bewusteloosheid en dood. Vooral het gebruik van clomipramine bij patiënten die behandeld worden met Parnate® is gevaarlijk.

- Bij gelijktijdig gebruik van tetracyclische antidepressiva (bepaalde middelen bij depressie) zoals maprotiline, mianserine en mirtazapine.
- Bij gelijktijdig gebruik van serotonine-heropnameremmers (bepaalde groep middelen bij depressie) zoals o.a. fluvoxamine, fluoxetine, paroxetine, sertraline en citalopram en escitalopram. Hetzelfde geldt bij gelijktijdig gebruik van een moderne (reversibele) MAO-remmer moclobemide (Aurorix). Bij gelijktijdig gebruik van deze middelen of vlak na het staken hiervan kan het zogenaamde serotonine-syndroom optreden. Dit is een zeer ernstig ziekteverschijnsel dat veroorzaakt wordt door een overschot aan serotonine in de hersenen. Kenmerken hiervan zijn o.a. opwinding en rusteloosheid, trillen en beven, diarree, plotseling samentrekken van de spieren, verhoging van de lichaamstemperatuur (koorts), verwarring, prikkelbaarheid en extreme opwinding welke kan overgaan in een zogenaamd delirium en kan leiden tot coma en dood. Vanwege de lange verblijftijd in het lichaam dient na het staken van de behandeling met fluoxetine een periode van tenminste 6 weken in acht te worden genomen alvorens met Parnate® te starten
- ***In combinatie met elk ander geneesmiddel zonder dat u dit heeft besproken met uw arts of apotheker.***
- In combinatie met normaal tyramine bevattend voedsel (zie verderop voor het tyramine beperkt dieet dat u moet volgen wanneer u Parnate® gebruikt).
- Bij een bestaande aandoening van de hersenvaten of een bestaande ernstige ziekte van de hartvaten.
- Bij een bestaand of vermoedelijk gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom)
- Bij een verhoogde schildklierwerking.
- Bij bekende leveraandoeningen.
- Bij ziekelijke afwijkingen van het bloed.

Wees extra voorzichtig met Parnate®:

- Wanneer u een operatie moet ondergaan. Vanwege de mogelijke wisselwerking met de middelen die bij een operatie worden gebruikt kan het wenselijk zijn het gebruik van Parnate®, ***indien mogelijk 2*** weken voor dat de operatie wordt uitgevoerd, te staken.
Bespreek dit dus tevoren met uw arts.
- bij patiënten met epilepsie (vallende ziekte). Bij gebruik van Parnate® kunnen toevallen optreden.
- bij een voorgeschiedenis van afhankelijkheid voor alcohol of drugs.
- bij ouderen die lijden aan hart/vaatziekten. Bij gebruik van Parnate® kan de angineuze pijn worden onderdrukt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Parnate® in combinatie met voedsel en drank:

Bij patiënten die MAO-remmers gebruiken kan tyramine in het voedsel de oorzaak zijn van een sterke stijging van de bloeddruk (zie ook “Mogelijke bijwerkingen”). Daarom dienen patiënten die worden behandeld met Parnate®, zich aan de volgende voorschriften van het zogenaamde “**tyramine-beperkte dieet**” te houden:

- **Kaas en kaasproducten.**

Hollandse kazen zijn gemaakt van gepasteuriseerde melk. Bij pasteuriseren wordt de melk verhit tot 72 graden celsius, waardoor de meeste bacteriën worden gedood. Kaas gemaakt van ongepasteuriseerde melk bevat meer tyramine **en is daarom niet toegestaan**. Wanneer op de verpakking staat: rauwmelkse kaas of lait cru, dan is de kaas niet gemaakt van gepasteuriseerde melk en is dus niet toegestaan. Aanbevolen wordt om kaas verpakt te kopen en te letten op de THT (datum ten minste houdbaar tot).

Niet toegestaan:

Smelt – en smeerkaas, rookkaas, boerenkaas.

Buitenlandse kaassoorten zoals Brie, Camembert, Emmenthaler, Gorgonzola, Gruyere, Feta, Mascarpone.

Oude overjarige Hollandse kaas, Geitenkaas, Schapenkaas.

Kaasproducten zoals kaaschips, kaaszoutjes, kaaskoekjes, kaasburgers en kaassoufflés.

Beperkt toegestaan:

Maximaal 2 plakken (=40 gram) van jong belegen, belegen en

extra belegen Hollandse kaas zoals Goudse, Edammer, Maasdammer en Leidse kaas.

In plaats van 1 plak kaas kunt u maximaal 10 gram (1 eetlepel) nemen van Parmezaanse kaas of Zwitserse strooikaas.

Onbeperkt toegestaan:

Jonge kaas zoals jonge Edammer, jonge Goudse, jonge Leidse, jonge

Maasdammer en jonge Maaslander

Zachte verpakte kazen zoals verse kaas of kwark, Hüttenkäse, Ricotta, Cottage cheese,

Mozzarella, cream cheese of roomkaas zoals Mon Chou, Boursin en Paturain.

- **Gistproducten**

Niet toegestaan:

Producten die pure gist bevatten zoals Marmite en Tartex.

Reformartikelen die gist bevatten zoals biergist en brooddrink.

Onbeperkt toegestaan:

Gist voor de bereiding van brood, taart en koekjes.

Gistextract in soepen en sauzen in zakjes, blik of pot, aangezien deze een kleine hoeveelheid gistextract bevatten.

- **Vlees, vleesvervangers, vis, kip en ei**

Niet toegestaan:

Rauw vlees, rauwe vis en ongere kip.

Gerookte vis zoals makreel en zalm.

Trassi

Rookworst die niet fabrieksmatig is bereid.

Beperkt toegestaan:

Salami (max. 1 plak, 15 gram) of cervelaatworst (max. 1 plak, 15 gram) of rookvlees, rauwe ham (max. 15 gram) of worstsoorten die hierop lijken (max. 1 plak, 15 gram) of 1 portie paté van 15 gram of ansjovis van 15 gram.

Onbeperkt toegestaan:

Alle soorten vlees en kip en vleeswaren behalve de hierboven genoemde onder “niet toegestaan” en “beperkt toegestaan”.

Ei.

Filet américain en ossenworst en rookworst (uitsluitend in fabrieksverpakking).

Zure haring (alleen uit pot gebruiken) en vis uit blik.

Zeer verse en zeer koel bewaarde vis: gebakken, gestoofd of gegrild. Let hierop bij een visbuffet.

Vleesvervangers op basis van noten, granen, soja, ei en Quorn en Valess producten.

- **Alcoholische dranken**

Niet toegestaan:

Ongepasteuriseerde melk.

Chiantiwijn en champagne.

Overige kruidenthee, thee met St. Janskruid of thee met gezondheidsclaim als goed voor bloeddruk, stofwisseling, stoelgang enz.

Witte bieren of zware bieren zoals Belgisch bier, kloosterbier, bier met extra gist, tapbier.

Beperkt toegestaan:

1-2 glazen wijn of sterke dranken.

1-2 flesjes of blikjes bier of alcoholvrij bier.

Onbeperkt toegestaan:

Frisdranken, vruchtensappen.

Koffie, (vruchten)thee en kruidenthee als kamille, kaneel, pepermunt, rooibos thee en groene thee, wintermelange e.d.

Water.

Melk en karnemelk.

Gedestilleerde en overige alcoholische dranken in overleg met arts.

- **Groenten en fruit**

Niet toegestaan:

Zuurkool.

Onbeperkt toegestaan:

Alle soorten behalve zuurkool.

- **Sojaproducten en gefermenteerde sauzen**

Niet toegestaan:

Vissaus, tamari en overige gefermenteerde Oosterse (vis) sauzen

Beperkt toegestaan:

Tempé (gefermenteerd sojaproduct) max. 100 gram per dag, mits vers en verpakt.

Sojasaus (ketjap) en producten die hierop lijken met mate (1 eetlepel per dag). Flesjes na openen in de koelkast bewaren.

Onbeperkt toegestaan:

Tahoe, tofu en alle overige producten waarin soja is verwerkt.

- **Eénpans gerechten en gekoelde maaltijden**

Niet toegestaan:

Eénpans gerechten, pizza en gekoelde maaltijden die veel (>20gram) kaas of oude of buitenlandse kaassoorten bevatten of salami.

Pizza's bevatten vaak salami en kaas.

Onbeperkt toegestaan:

Eénpans gerechten zonder kaas, salami en andere producten die niet zijn toegestaan.

Zorg bij deze producten ervoor dat bij het vervoer naar huis de temperatuur onder 10graden Celsius blijft. Thuis direct in de koelkast plaatsen en consumeren vóór de “tenminste houdbaar tot” datum (THT).

- **Drop (en reformartikelen)**

Niet toegestaan:

Reformartikelen zoals ginseng producten, St. Janskruid

Zuurdesembrood.

Vitaminepreparaten in dosering hoger dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

L-tryptofaan.

Beperkt toegestaan:

Zoete en zoute drop vanwege invloed op de bloeddruk, max. 50 gram.

Zoethoutthee max.. 0,5 liter.

- **Chocolade, schaal – en schelpdieren en alcohol**

Kunnen een overgevoeligheidsreactie, bijvoorbeeld hoofdpijn geven, welke niet samenhangt met het gebruik van een Parnate®. Indien u dit bij uzelf merkt, vermijd dan deze producten.

- **Algemene voedingsadviezen**

Ga uit van verse producten en bewaar deze niet te lang.

Bewaar de voedingsmiddelen in de koelkast bij een temperatuur van maximaal 7 graden Celsius.

Gebruik melkproducten vóór de op de verpakking vermelde uiterste consumptiedatum (THT). Na openen kunt u de melk(producten) nog maximaal 3 dagen gebruiken.

Verpakte kaas dient na openen niet langer dan 2 weken in de koelkast bewaard te worden, ook als is de houdbaarheidstermijn nog niet verlopen.

Vlees en vis zo snel mogelijk na aankoop bereiden.

Diepgevroren vlees, vis en kip, altijd in de koelkast of magnetron ontdooien en meteen daarna bereiden.

Eieren maximaal 10 dagen in de koelkast bewaren en in elk geval voor het einde van de houdbaarheidstermijn gebruiken.

Bereide voedingsmiddelen dienen bij bewaring zo snel mogelijk te worden afgekoeld en in de koelkast te worden geplaatst. Bereide vlees/vis/kip maximaal 24 uur in de koelkast bewaren (zie THT datum). Soep kunt u 24 uur na bereiding eten, mits snel afgekoeld en koel bewaard. Vleeswaren kunt u maximaal 4 dagen in de koelkast bewaren. Zie de THT datum.

Stopt u met het gebruik van Parnate® tabletten dan dient u dit voedingsadvies nog 10 dagen te blijven volgen.

De dieetvoorzorgsmaatregelen zijn aangepast aan de Nederlandse situatie, overeenkomstig de

dieetadviezen uitgegeven door de afdeling diëtetiek divisie Psychiatrie, Parnassia-Bavogroep, Monsterseweg 83, 2553 RJ Den Haag.

Zwangerschap:

Over het gebruik van tranylcypromine in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tijdens de zwangerschap dient tranylcypromine daarom bij voorkeur niet te worden gebruikt, tenzij de arts dit noodzakelijk vindt.

Bespreek dit met uw arts of apotheker.

Borstvoeding:

Tranylcypromine gaat over in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding wordt aanbevolen geen tranylcypromine te gebruiken.

Bespreek dit met uw arts of apotheker.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Tranylcypromine kan het beoordelingsvermogen en het reactievermogen beïnvloeden. U dient dan ook voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines. U wordt afgeraden te rijden in de eerste week na het starten van de behandeling en na dosisverhoging.

Gebruik van Parnate® in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiters wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met:

- guanethidine (middel bij verhoogde bloeddruk en verhoogde oogboldruk). De werking van guanethidine wordt verminderd.
- reserpine (bloeddrukverlagend middel). Bij gelijktijdig gebruik kan hyperactiviteit optreden.
- methyldopa (bloeddrukverlagend middel). Er kan een prikkeling van het centrale zenuwstelsel o.a. met hallucinaties (waarnemingen van dingen die er niet zijn) optreden.
- bloedsuikerverlagende middelen die via de mond worden ingenomen (orale antidiabetica) of insuline. De bloedsuikerverlagende werking van deze middelen kan worden versterkt.
- bepaalde geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson (anticholinergische anti parkinson middelen bijvoorbeeld procyclidine, biperideen). De werking van deze middelen kan worden versterkt.
- narcotische analgetica (bepaalde groep van sterke pijnstillende middelen) met uitzondering van pethidine (zie "Gebruik Parnate® niet"). De werking van sterke pijnstillende middelen kan worden versterkt.
- barbituraten (middelen bij epilepsie). De werking van deze middelen kan worden versterkt.

- metrizamide (röntgencontrastmiddel). Gelijktijdig gebruik met MAO-remmers dient te worden vermeden, daar deze de epilepsie-aanvalsdrempel kunnen verlagen.
- tryptofaan (middel bij o.a. depressie en slaapstoornissen). Gelijktijdig gebruik van dit middel kan leiden tot plotseling samentrekken van de spieren, rillen, verhoogde lichaamstemperatuur, extreme opwinding of lichte razernij en verwardheid.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Parnate® ingenomen?

Dosering:

volwassenen:

De aanvangsdosering is doorgaans 20 mg/dag: 's ochtends en 's avonds 1 tablet à 10 mg. Het kan overigens aangewezen zijn de tabletten 's ochtends en 's middags, of geheel 's ochtends in te nemen, bijvoorbeeld bij slaapstoornissen t.g.v. Parnate®.

Als het resultaat niet voldoende is, kan uw arts de dosering geleidelijk verhogen tot maximaal 100mg/dag.

Indien een bevredigend resultaat is bereikt, kan uw arts de dosis verlagen tot een onderhoudsdosering van veelal 40-60 mg per dag. Indien Parnate® gelijktijdig wordt gebruikt met een kalmerend middel, is het niet nodig de dosering van Parnate® aan te passen.

ouderen:

Bij oudere patiënten dient Parnate® met extra voorzichtigheid en meestal in een wat lagere dosering te worden gebruikt. (zie ook "Wees extra voorzichtig met Parnate®").

Wijze van innemen:

De tabletten innemen met een half glas water.

Duur van de behandeling:

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Parnate® moet gebruiken.

Als u vragen heeft over de dosering of het moment van inname van Parnate®, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Parnate® heeft ingenomen:

Wanneer u teveel van Parnate® heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

De verschijnselen die kunnen optreden bij een overdosering zijn meestal gelijk aan die welke beschreven zijn onder de rubriek "Mogelijke bijwerkingen", maar ze kunnen wel intensiever zijn en tevens gepaard gaan met verhoogde lichaamstemperatuur, stuipen en trillingen en kunnen optreden na een periode zonder vergiftigingsverschijnselen.

De behandeling zal meestal in het ziekenhuis plaats vinden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Parnate® in te nemen:

Wanneer u vergeten bent Parnate in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgend Parnate® dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Parnate® om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Parnate® wordt gestopt:

Overleg hierover altijd met uw arts of apotheker.

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen onttrekkingsverschijnselen optreden: hoofdpijn, beven, misselijkheid, koude- of warmtegevoelens. Het is daarom verstandig nooit ineens met Parnate® te stoppen, maar als u wilt stoppen, de dosering geleidelijk te verminderen.

Ook kunnen na staken van de behandeling de klachten die voor de behandeling bestonden (depressie, angststoornis) weer optreden.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Parnate® bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Slapeloosheid is de meest voorkomende bijwerking; dit kan gewoonlijk worden voorkomen door de laatste dosis van de dag niet na 3 uur 's middags in te nemen of de dosis te verlagen. Eventueel kan een slaapmiddel worden gebruikt, maar bij voorkeur niet een zogenaamd benzodiazepine hypnoticum. ***Overleg hierover altijd met uw arts of apotheker.***

Orthostatische hypotensie bloeddrukdaling bij het plotseling opstaan vanuit liggende of zittende houding die duizeligheid tot gevolg heeft. Dit kan soms worden voorkomen door niet ineens op te staan, maar eerst in liggende positie de benen te bewegen (fietsbewegingen), dan te gaan zitten en dan te gaan staan. Als u voor Parnate® bloeddrukverlagers gebruikte, kunnen deze eventueel worden verminderd of worden gestaakt. Ook kan de arts eventueel een medicijn geven om de bloeddrukdaling tegen te gaan. ***Overleg hierover altijd met uw arts of apotheker.***

Bloeddrukstijging: bij gebruik van Parnate® kan de bloeddruk licht stijgen (hypertensie).

Eventueel kan uw arts u medicijnen geven om de bloeddruk weer te verlagen.

Ook kan acuut een sterke stijging van de bloeddruk (hypertensieve crisis) optreden, met name in combinatie met bepaalde medicijnen of met voedsel dat tyramine bevat (zie "Gebruik van Parnate® in combinatie met voedsel en drank"). Deze sterke bloeddrukstijging kan lijden tot gevaarlijke complicaties zoals het optreden van een hersenbloeding en zelfs dodelijk zijn.

Verschijnselen die hierbij kunnen optreden zijn acuut optredende hevige hoofdpijn, hartkloppingen, pijnlijke stijve nek, regelmatig overslaan van het hart, vaak met pijn onder het borstbeen, transpireren, bleekheid, soms gevolgd door opvliegers, pupilverwijding en

lichtschuwheid.

Indien zich dergelijke verschijnselen voordoen dient u direct het gebruik van tranylcypromine te staken en uw arts te raadplegen.

Voor de behandeling van een ernstige hypertensieve crisis kan een acute opname in een ziekenhuis noodzakelijk zijn. Verder kan de aanval van hoge bloeddruk worden bestreden met nifedipine (10 mg, na 1 uur zo nodig te herhalen, tot maximaal 60 mg/dag).

Andere bijwerkingen: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, droge mond, wazig zien, hoofdpijn, diarree, misselijkheid en braken, pijn in de gewrichten van handen of voeten en huiduitslag zijn gemeld. Ook kan prikkelbaarheid optreden inclusief een toename van angst en opgewondenheid.

Zelden zijn gemeld, leverbeschadiging, geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), hallucinaties (dingen zien en horen die er niet zijn) en bloedbeeldafwijkingen (bloeddyscrasieën).

5. Hoe bewaart u Parnate®?

Parnate® buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C buiten invloed van licht en vocht, in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Parnate® niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”.

De aanduiding “exp” betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2009, o.a. onder auspiciën van Prof. Dr. W. A. Nolen, psychiater en verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.